

# *О профилактике ИППП*

*кафедра кожных и венерических  
болезней Белгосмедуниверситета*



*Что такое ИППП?*

HOUSE

**ИППП** (инфекции,

передаваемые половым путем или  
венерические болезни)

– группа инфекционных заболеваний,  
которые распространяются при половом  
контакте с человеком, имеющим эту  
инфекцию.

Значительно реже эти болезни  
передаются неполовым путем.

Число известных сегодня  
ИППП превышает **30**.





*Почему это важно?*

Нередко **ИППП**

- **приводят к:**

\* семейным конфликтам,

\* нарушению физического и нервно-психического состояния;

- **являются факторами:**

\* дестабилизации

демографической обстановки,

\* **высоких экономических затрат**  
для государства на лечение и

**реабилитацию больных.**





В случае несвоевременной диагностики и неэффективного лечения ИППП вызывают:

- осложнения,
- утрату трудоспособности,
- приводят к дефектам внутриутробного развития,
- тяжелым врожденным заболеваниям у детей,
- поражению внутренних органов и систем с последующей инвалидизацией.

# Последствия ИППП:

(Для девушек)

- 1. нарушение репродуктивной функции**  
(бесплодие, невынашивание беременности, внематочная беременность, врожденные уродства у потомства);
- 2. хронические воспалительные процессы женских половых органов;**
- 3. онкологические заболевания половых органов.**



# Последствия ИППП:

(Для парней)

- 1.хронические воспалительные процессы мочеполового тракта;**
- 2.бесплодие**
- 3.снижение потенции;**
- 4.онкологические заболевания половых органов.**





*Распространённость*

HOUSE

M.D.

FOX

ИППП в Беларуси занимают **3-е место**  
среди всех инфекционных заболеваний:

**1. ОРВИ**

**2. гельминтозы, т.е.  
глисты**

**3. ИППП**  
(примерно 300-400  
тыс. случаев в год).



Ты всех любишь  
Это патология




Подавляющее число инфицированных ИППП- это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет (60-70% из всех).

*Почему СПИД, сифилис и другие ИППП являются серьезными?*



**Дело в том, что СПИД медленно ведет к смерти!  
Для полного излечения лекарства или вакцины  
нет.**

**ИППП могут нарушать деятельность  
репродуктивных органов и вызывать бесплодие,  
разрушать головной и спинной мозг, различные  
другие органы и приводить к инвалидности !**



*Как узнать, что у  
меня что-то не так?*



# Признаки заболевания

1. Необычные  
выделения

*(обильные,  
желтоватые,  
пенистые,  
кровянистые,  
творожистые,  
с неприятным  
запахом и т.д.)*

2. Сыпь, язвочки,  
пузырьки,  
эрозии

*(на коже,  
слизистых)*



3. Дискомфортные  
ощущения

*(боль, зуд, жжение,  
раздражение, отек  
в области половых  
органов)*


*Путь передачи ясен,  
Но...*



**HOUSE**



# *...он не один*



1.

- *Половой*

2.


- *Через инфицированную кровь*

3.

- *От матери ребёнку*

# Половой путь передачи

-при незащищённом  
половом контакте



Повышение степени риска заражения

# *Нельзя заразиться при:*

- Рукопожатии
- При чихании
- При дружеском поцелуе и дружеских объятиях
- При пользовании фонтанчиком для питья воды или телефонной трубкой
- При укусах насекомых
- При употреблении продуктов
- В переполненном общественном транспорте



*Подробнее  
об ИППП?*



# Рассмотрим некоторые ИППП:

1. Сифилис
2. Гонорея
3. Хламидиоз
4. Трихомониаз
5. Аногенитальные бородавки
6. Генитальный герпес
7. ВИЧ-инфекция
8. Микоплазмоз



# Сифилис

## *Возбудитель:*

бактерия, называемая  
бледной спирохетой  
(трепонемой).



*Пути передачи:* те же + случаи бытового заражения встречаются редко, но возможны.

*Скрытый период:* около месяца (3-4 недели от момента заражения)

# Клиника: 3 периода

## 1. первичный сифилис

-безболезненная округлая язва – *твердый шанкр*  
(расположение –  
в зависимости от вида полового контакта);  
заживает через 6-8 недель без лечения;



## 2. вторичный сифилис

- характерны разнообразные высыпания на коже, слизистых оболочках; может быть выпадение волос.

Характерно "волнообразное" течение (сыпь постепенно проходит сама по себе, даже без лечения, но затем возникает вновь).

В этом периоде возможны серьезные осложнения:

- поражение внутренних органов и
- нервной системы (нейросифилис).





# **3. третичный сифилис**

- наступает, если сифилис не лечить или лечиться недостаточно.

*Поражение жизненно важных органов и систем .*



Сифилис с самого начала может протекать и **скрыто** (без клинических проявлений), такая форма болезни не менее опасна!



**Диагностика:** серологическое исследование для обнаружения в крови антител к возбудителю сифилиса - бледной спирохете

# **Врождённый сифилис-** внутриутробное заражение ребёнка



Саблевидные голени




# Гонорея

**Возбудитель:** (бактерия) - гонококк Нейссера.


**Пути передачи:** все виды половых контактов;  
Возможно бытовое заражение

**Скрытый период:** 3-7 дней

**Клиника:** у мужчин протекает с гораздо более ярко выраженными симптомами.



Главный симптом- **гнойные выделения**, часто достаточно обильные!



# Хламидиоз



**Возбудитель:** среднее между бактериями и вирусами - **Хламидия** - внутриклеточный паразит


**Пути передачи:** половой, возможен бытовой и внутриутробный.

**Скрытый период:** 20-30 дней

**Клиника:** Протекает **малосимптомно**, особенно у женщин:


- зуд;
- умеренные выделения;
- резь при мочеиспускании;

# Трихомониаз



**Возбудитель:** Влагалищная трихомонада - одноклеточный микроорганизм, относящийся к типу простейших.


**Пути передачи:** половой, возможен бытовой.




**Скрытый период:** от 3-5 дней до 2-3 недель от момента заражения.

**Клиника:** у женщины все симптомы гораздо **более выражены**, чем у мужчин. Мужчины довольно часто являются "носителями" трихомонад.

- обильные выделения;
- сильный зуд, жжение;
- покраснение ,отёчность;



# Аногенитальные бородавки



**Возбудитель:** Аногенитальные типы вирусов папилломы человека, чаще всего - **6 и 11 тип**.

**Пути передачи:** у взрослых чаще половой контакт, у детей трансплацентарный, перинатальный, контактно-бытовой

**Скрытый период:** от 3 месяцев до нескольких лет

**Клиника:** характеризуется бородавчатыми образованиями, состоящими из большого числа сливающихся узелковых элементов с выростами, внешне напоминающими цветную капусту или петушиный гребень.



# Генитальный герпес

**Возбудитель:** вирус простого герпеса  
1-го или 2-го типа;

**Пути передачи:** половой,  
от матери-ребёнку;

**Скрытый период:** 1-2 недели;

**Клиника:**

покраснение



пузырьки



Язвочки



Корочки



Заживает через 5-10 дней;



# Вич-Инфекция

**Возбудитель:** вирус иммунодефицита человека



**Пути передачи:** половой, от матери-ребёнку, парентеральный (то есть через кровь);

**Скрытый период:** в среднем 8 лет;

**Клиника:** Для ВИЧ-инфекций не характерна специфическая клиническая картина.



Она складывается, в основном, из клинических проявлений присоединившихся заболеваний: кожные инфекции (грибковые, вирусные, гнойничковые), туберкулез, онкологические заболевания);

# Микоплазмоз


**Возбудитель:** микоплазмы (уреаплазмы) - внутриклеточные микроорганизмы

**Пути передачи:** половой, возможен бытовой, внутриутробный.

**Скрытый период:** от 10-20 до 40-60 дней

**Клиника:** малосимптомное течение

- скудные прозрачные выделения;
- умеренная боль и жжение при мочеиспускании;
- боль внизу живота (при воспалении матки и придатков);
- симптомы простатита (при поражении предстательной железы).





*Что можно сделать,  
чтобы не  
заразиться?*

1. Отложить начало половой жизни на более поздний возраст;
2. Сокращение числа сексуальных партнеров до одного, самого надежного;
3. Исключение случайных половых связей;
4. Использование средств индивидуальной защиты:
  - 1) презерватив,
  - 2) экстренная противовенерическая профилактика:

\* 0,05% р-р хлоргексидина биглюконата,

\* 0,01% р-р септомирин

будет эффективна в том случае, если проведена не позже 2-х часов после полового акта (еще лучше в течение первого часа).



Нельзя соглашаться на "незащищенный" половой контакт с тем, кого есть основания подозревать в легкомысленном сексуальном поведении и внутривенном употреблении наркотиков.





*Что делать, если заболел?*

# Лечиться !

Как?

*Не медлите, если заподозрили заболевание - обращайтесь в медицинские учреждения!*



**Во-первых, не стоит заниматься самолечением;**

**Во-вторых, ни в коем случае нельзя забывать о лечении партнера;**

**В-третьих, соблюдение условия прекращения половой жизни на весь период лечения и контрольного обследования.**

# *Помните:*



- 1. Вы имеете право на уважительное отношение медперсонала;*
- 2. сохранение «врачебной тайны» (не узнают ни родители, ни учителя)*
- 3. вам не придётся ложиться в стационар*



# Куда обратиться?

**1.** Минский городской клинический кожно- венерологический диспансер - ул.Прилукская, 46а, тел.270-91-16;  
(на метро до ст.м. «Немига», далее трол.№53 до ост. «ул.Прилукская», ст.м. «Михалово»)

*Если Вы предпочитаете обследоваться анонимно ( без предъявления документа, удостоверяющего личность), то сможете сделать это в платных анонимных кабинетах, организованных при Минском городском кожно-венерологическом диспансере .*

**2.** Филиалы: филиал №1 (ул. Нахимова, 4 с 11.00 до 19.00; тел. 226-04-10 ) и №2 (ул. Смолячкова, 1 с 11.00 до 19.00; тел. 233-05-88);

**3.** Любая поликлиника-исследование на ВИЧ-инфекцию

**4.** Центр профилактики СПИДа (ул. К.Цеткин,4, возле музыкального театра, горячая линия-321 22 68). Исследование на ВИЧ-инфекцию-бесплатное; на сифилис, гепатит-платное.

**5.** Женская консультация или врач-уролог по месту жительства

Будьте здоровы и  
счастливы 😊

